


Analytická geometrie přímky – rovnice přímky, vzájemná poloha přímek, odchylka přímek, průsečík přímek, vzdálenost přímky od roviny

Parametrické vyjádření přímky v rovině

Přímka je jednoznačně určena dvěma různými body . K nalezení parametrické rovnice přímky potřebujeme mít dán jeden bod a vektor ( směrový vektor přímky ).



Přímka je množina bodů  $X$  . Každý bod  $X = [x,y]$  na přímce  $p$  dostaneme tak , že k bodu  $A = [a_1,a_2]$  přičteme  $t$  násobek vektoru  $v$ .

Tedy  $X = A + t \cdot v$  po rozepsání do souřadnic dostaneme parametrickou rovnici přímky:

$$p: \quad \begin{aligned} x &= a_1 + t \cdot v_1 \\ y &= a_2 + t \cdot v_2 \end{aligned} \quad \text{kde } t \text{ je parametr}$$

Příklad:

Napište parametrickou rovnici přímky , určené bodem  $A = [3,4]$  a vektorem  $v = (2,5)$ .

Řešení:

$$p: \quad \begin{aligned} x &= 3 + 2 \cdot t \\ y &= 4 + 5 \cdot t \end{aligned}$$

Příklad:

Napište parametrickou rovnici přímky určené bodem  $A = [5,6]$  a bodem  $B = [7,7]$ .

Řešení:

Z dvojice bodů  $A,B$  nejprve určíme vektor  $AB = u = (2,1)$ .

$$p: \quad \begin{aligned} x &= 5 + 2 \cdot t \\ y &= 6 + t \end{aligned}$$

Příklad:

Je dána přímka  $p: x = 5 + 2 \cdot t ; y = 6 + t$  . Určete zda na této přímce leží bod  $K = [ 1,4 ]$  a bod  $M = [ 3,6 ]$  .

Řešení:

Leží-li bod na přímce, pak jeho souřadnice musí vyhovovat rovnici přímky.

$$K: \quad \begin{aligned} 1 &= 5 + 2 \cdot t & \Rightarrow t &= -2 \\ 4 &= 6 + t & \Rightarrow t &= -2 \end{aligned}$$

Protože vyšlo v obou rovnicích stejné  $t$  , bod  $K$  leží na přímce  $p$ .

$$M: \quad \begin{aligned} 3 &= 5 + 2 \cdot t & \Rightarrow t &= -1 \\ 6 &= 6 + t & \Rightarrow t &= 0 \end{aligned}$$

Protože vyšlo v obou rovnicích různé  $t$  , bod  $M$  neleží na přímce  $p$ .

Cvičení:

- Napište parametrickou rovnici přímky určené bodem  $P = [ 3 , -8 ]$  a směrovým vektorem  $v = ( 3 , 4 )$ .  
 $[ x = 3+3t , y = -8+4t ]$
- Napište parametrickou rovnici přímky určené bodem  $A = [ 6 , 3 ]$  a bodem  $B = [ 3 , -2 ]$   
 $[ x = 6-3t , y = 3-5t ]$

3. Jsou dány tři body  $A = [-4, 2]$ ,  $B = [2, 0]$ ,  $C = [1, 6]$ . Tyto body tvoří trojúhelník. Napište parametrické rovnice těžnic trojúhelníku ABC.

$$\left[ x = -4 + \frac{11}{2}t; y = 2 + t \quad x = 2 - \frac{7}{2}k; y = 4k \quad x = 1 - 2m; y = 6 - 5m \right]$$

4. Jsou dány body  $A = [-3, 0]$ ,  $B = [1, 4]$ . Určete vzájemnou polohu přímky určené body A a B s přímkou  $p: x = 2 - 4t, y = -1 + 4t$ .

## Obecná rovnice přímky

Obecná rovnice přímky v rovině má tvar:  $ax + by + c = 0$

kde  $a, b, c$  jsou reálná čísla.

Vektor  $n = (a, b)$  je vektor kolmý k přímce, říkáme mu vektor normálový.

Obecnou rovnici přímky získáme z parametrické rovnice tak, že obě rovnice vynásobíme takovými čísly, aby po jejich sečtení vypadl parametr  $t$ .

Příklad:

Přímku  $p: x = 5 + 2t; y = 6 + t$  převed'te na obecný tvar.

Řešení:

$$\begin{aligned} p: \quad & x = 5 + 2t \\ & y = 6 + t \quad / \cdot (-2) \\ & x = 5 + 2t \\ & -2y = -12 - 2t \quad \text{rovnice sečteme} \\ & x - 2y = -7 \\ p: \quad & x - 2y + 7 = 0 \end{aligned}$$

• Máme-li dány dva body a chceme sestavit obecnou rovnici přímky určené těmito body, můžeme postupovat dvěma způsoby:

- 1) Sestavíme nejprve parametrickou rovnici přímky a postupem z předchozího příkladu přejdeme na rovnici obecnou
- 2) Najdeme normálový vektor přímky a postupujeme podle následujícího příkladu:

Příklad:

Napište obecnou rovnici přímky určené bodem  $A = [-2, 6]$  a bodem  $B = [4, -3]$ .

Řešení:

Nejprve najdeme vektor  $v = AB = (6, -9)$ . K němu kolmý vektor (normálový vektor přímky)  $n = (9, 6)$ .

Máme již první koeficienty obecné rovnice  $a = 9, b = 6$ .

Rovnice přímky bude mít tento tvar:  $9x + 6y + c = 0$

Zbývá nalézt koeficient  $c$ . Ten najdeme tak, že dosadíme jeden z bodů A nebo B za  $x$  a  $y$  do rovnice:

$$\begin{aligned} A \in p: \quad & 9 \cdot (-2) + 6 \cdot 6 + c = 0 \\ & -18 + 36 + c = 0 \\ & c = -18 \end{aligned}$$

Celá rovnice bude mít tvar:  $9x + 6y - 18 = 0$  můžeme ji ještě dělit 3

$$p: \quad 3x + 2y - 6 = 0$$

## **Vzdálenost bodu od přímky**

Vzdálenost bodu  $A = [x_0, y_0]$  od přímky  $p: ax + by + c = 0$

Vypočteme podle vzorce  $d = \frac{|ax_0 + by_0 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$

Příklad:

Je dána přímka p :  $2x - 3y + 7 = 0$  . Vypočtete vzdálenost bodu K = [ -1 , 2 ] od této přímky.

Řešení:

Vypočteme podle vzorce  $d = \frac{|ax_0 + by_0 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}} = \frac{|2x - 3y + 7|}{\sqrt{4 + 9}} = \frac{|-2 - 6 + 7|}{\sqrt{13}} = 0,277$

### **Úhel dvou přímek :**

Vypočteme buď jako úhel dvou směrových nebo dvou normálových vektorů takto:

$$\cos \alpha = \frac{|u \circ v|}{|u| \cdot |v|}$$

$$\cos \alpha = \frac{|u_1 \cdot v_1 + u_2 \cdot v_2|}{\sqrt{u_1^2 + u_2^2} \cdot \sqrt{v_1^2 + v_2^2}}$$

Příklad:

Určete úhel přímek: p:  $-2x + 3y + 7 = 0$

q:  $3x - 4y + 5 = 0$

Řešení:

$n_p = (-2, 3)$  ;  $n_q = (3, -4)$

$$\cos \alpha = \frac{|n_{p1} \cdot n_{q1} + n_{p2} \cdot n_{q2}|}{\sqrt{n_{p1}^2 + n_{p2}^2} \cdot \sqrt{n_{q1}^2 + n_{q2}^2}} = \frac{|-6 - 12|}{\sqrt{4 + 9} \sqrt{9 + 16}} = \frac{18}{5\sqrt{13}}$$

$\alpha = 3^\circ 10'$

### **Vzájemná poloha 2 přímek v rovině**

Vzájemnou polohu určíme pomocí směrových vektorů obou přímek. Jsou-li přímky zadány obecnou rovnicí, je lepší místo směrových vektorů použít normálové.

a) rovnoběžné - totožné - směrové vektory lineárně závislé, všechny body společné

- různé - směrové vektory lineárně závislé, žádný společný bod

b) různoběžné - směrové vektory lineárně nezávislé, jeden společný bod - průsečík

Průsečík obou přímek najdeme, řešíme-li soustavu dvou rovnic o dvou neznámých.

Příklad:

Určete vzájemnou polohu přímek p:

$$x = -1 + 3t$$

$$y = 2 - t$$

q:  $x = 2 - 3k$

$$y = -3 + k$$

Řešení:

$u_p = (3, -1)$  ;  $v_q = (-3, 1)$

Pro směrové vektory obou přímek platí :  $u_p = -v_q$

Přímky mohou být buď totožné nebo rovnoběžné.

Na přímce zvolíme libovolný bod C : volíme např.  $t = 2$   $x = 5$  ;  $y = 0$   $C = [ 5 , 0 ]$

Ověříme, zda tento bod leží i na přímce q :  $x = 2 - 3.k$   $5 = 2 - 3.k$   $k = -1$

$$y = -3 + k \quad 0 = -3 + k \quad k = 3$$

Protože hodnota k je různá, bod C na q neleží a přímky jsou rovnoběžné různé.

#### Příklad:

Určete vzájemnou polohu přímek p:  $-2x + 3y + 7 = 0$

$$q: 3x - 4y + 5 = 0$$

#### Řešení:

$n_p = (-2, 3)$  ;  $n_q = (3, -4)$  - tyto vektory jsou lineárně nezávislé - přímky jsou **různoběžné**

Určíme jejich průsečík P:  $-2x + 3y + 7 = 0$  / .3

$$\underline{3x - 4y + 5 = 0} \quad / .2$$

$$-6x + 9y + 21 = 0$$

$$\underline{6x - 8y + 10 = 0}$$

obě rovnice sečteme

$$y + 31 = 0 \quad \underline{y = -31}$$

$$x = \frac{3y + 7}{2} = \frac{-93 + 7}{2} = -43 \quad \mathbf{P = [ -43 , -31 ]}$$

Vzdálenost dvou rovnoběžných přímek určíme tak , že na jedné z nich zvolíme libovolný bod a podle vzorce vypočteme jeho vzdálenost od druhé přímky.

#### Příklad:

Je dána přímka p :  $-2x + 3y + 7 = 0$

$$q : -4x + 6y + 7 = 0$$

Určete jejich vzdálenost.

#### Řešení:

$n_p = (-2, 3)$  ;  $n_q = (-4, 6)$  - tyto vektory jsou lineárně závislé , ale koeficient c v druhé rovnici není dvojnásobkem c v první rovnici - přímky jsou **rovnoběžné**

Na p zvolíme libovolný bod :  $x = -1$  ( volíme libovolně ) y vyjde z rovnice  $-y = -3$

$$A = [ -1 , -3 ]$$

$$d = \frac{|ax_0 + by_0 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

$$d = \frac{|-4x_0 + 6y_0 + 7|}{\sqrt{16 + 36}} = \frac{|4 - 18 + 7|}{\sqrt{52}} = 0,9707$$

#### Cvičení:

5. Napište obecnou rovnici přímky určené bodem A=[ 1,2 ] a B = [ 2, 1 ].

$$[ x + y - 3 = 0 ]$$

6. Napište rovnici přímky, která prochází bodem A=[ -3,2 ] a je rovnoběžná s osou x.

$$[ y = 2 ]$$

7. Napište rovnici přímky, která prochází bodem A=[ -3,2 ] a je rovnoběžná s osou y.

$$[ x = -3 ]$$

8. Napište rovnici přímky, která prochází bodem A=[ -3,2 ] a je rovnoběžná s přímkou  $2x - 5y + 7 = 0$ .

$$[ 2x - 5y + 16 = 0 ]$$

9. Určete vzájemnou polohu dvou přímek  $p$ :  $x = 3+3t, y = -8+4t$   
 $q$ :  $-3x + 2y - 5 = 0$

Určete případný průsečík, úhel nebo vzdálenost.

$$[\text{různob.}; P = [ \frac{141}{17}; \frac{-16}{17} ]; \alpha = 3^\circ 10'$$

10. Vypočtete odchylku přímek  $p$ :  $x - 3y + 6 = 0$ ;  $q$ :  $x + 2y - 8 = 0$   
 $[ 45^\circ ]$

11. Napište rovnici přímky, která prochází bodem  $A = [ 4, 3 ]$  a má od přímky  $x - y + 7 = 0$  odchylku  $45^\circ$ .  
 $[ x - 4 = 0 \text{ nebo } y - 3 = 0 ]$


12. Najděte průsečík přímek  $p$ :  $2x - y - 3 = 0$ ,  $q$ :  $3x + y - 2 = 0$ .  
 $[ P = [ 1, -1 ] ]$

## Směrnice tvar rovnice přímky

Je to rovnice v tomto tvaru:


$$y = kx + q$$

Proměnnou  $k$  nazýváme směrnice přímky a platí:  $k = \text{tg } \alpha$ , kde  $\alpha$  je úhel přímky  $p$  s osou  $x$



Proměnná  $q$  se označuje úsek přímky na ose  $y$ . Přímka ve tvaru  $y = kx + q$  tedy vždy prochází bodem  $[ 0, q ]$ .

Pro přímku určenou dvěma body  $A = [ x_1, y_1 ]$ ;  $B = [ x_2, y_2 ]$  platí vzorec:



$$k = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

$$k = \text{tg } \alpha = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

### Příklad:

Napište směrnice rovnici přímky  $p$ , která je určena body  $A = [ 6, 1 ]$ ;  $B = [ 9, 10 ]$ .

### Řešení:

Z daného vztahu určíme  $k$ :  $k = \frac{10 - 1}{9 - 6} = \frac{9}{3} = 3$

Rovnice má tvar  $y = 3x + q$

Neznámou  $q$  zjistíme dosazením libovolného bodu do rovnice:

$$1 = 3 \cdot 6 + q$$

$$q = -17$$

Rovnice má tvar  $y = 3x - 17$

**Tento tvar rovnice přímky připomíná lineární funkci.**

### Cvičení:

- 1.) Určete směrnicový tvar rovnice přímky, dané bodem  $A = [4; 2]$  a směrovým úhlem  $\alpha = \frac{2\pi}{3}$ .

$$[ y = -\sqrt{3}x + (2 + 4\sqrt{3}) ]$$

- 2.) Určete směrnicový tvar rovnice přímky, dané bodem  $A = [-3; 0]$  a bodem  $B = [ \frac{14}{3}; -2 ]$

$$[ y = -\frac{6}{23}x - \frac{18}{23} ]$$

- 3.) Jsou dány body  $A = [-5; 4]$  a  $B = [m; -3]$ . Určete číslo  $m$  tak, aby přímka daná body  $A, B$  měla směrnici  $k = -\frac{3}{4}$ . Napište její rovnici v směrnicovém tvaru.

$$[ m = \frac{13}{3}; y = -\frac{3}{4}x + \frac{1}{4} ]$$

- 4.) Napište ve směrnicovém tvaru rovnici přímky, která prochází počátkem a je rovnoběžná s přímkou danou body  $A = [-1; -4]$  a  $B = [4; 7]$

$$[ y = -\frac{3}{4}x + \frac{1}{4} ]$$

- 5.) Napište ve směrnicovém tvaru rovnici přímky, která prochází počátkem bodem  $A = [3; 0]$  a její úsek na ose  $y$  je  $q = -\frac{5}{2}$

$$[ y = \frac{5}{6}x - \frac{5}{2} ]$$

- 6.) Napište ve směrnicovém tvaru rovnici přímky, která prochází počátkem bodem  $A = [4; 6]$  a je kolmá k přímce o rovnici  $7x - 2y + 6 = 0$ .

$$[ y = -\frac{2}{7}x + \frac{50}{7} ]$$

- 7.) Určete směrnici a úsek  $q$  přímky dané rovnicí  $9x - 4y + 12 = 0$ .

$$[ k = 2,25; q = 3 ]$$

- 8.) Přímka  $p$  má rovnici  $y = \frac{2}{3}x + \frac{4}{5}$ . Napište obecnou rovnici přímky.

$$[ 10x - 15y - 12 = 0 ]$$